ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ АЗОТНО-ФОСФОРНО-КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СПАРЖЕВОЙ ФАСОЛИ

Г.В. Пироговская¹, А.М. Русалович¹, В.И. Сороко¹, О.П. Сазоненко¹, О.И. Исаева¹, А.А. Аутко²

¹Институт почвоведения и агрохимии, г. Минск, Беларусь

²Институт овощеводства, п. Самохваловичи, Беларусь

ВВЕДЕНИЕ

Фасоль спаржевая – ценная пищевая культура. Фасоль богата белком (17-30%), по аминокислотному составу близкому к животным белкам. Она содержит также крахмал, клетчатку, сахара, витамины (С, группы В, каротин, РР), микроэлементы (медь, цинк и др.). Сахарные сорта фасоли не имеют пергаментного слоя и грубых волокон в зеленых бобах (лопатках), поэтому они пригодны для продовольственных целей [1].

В пищу у сахарных сортов используются зеленые бобы (лопатки) или незрелые семена. Сочные незрелые бобы используются в отварном, тушеном, запеченом, консервированном виде, их можно также засаливать и сушить. В зеленых бобах, по сравнению со зрелыми, меньше белков (почти в два раза), но больше сахаров и витамина С, благоприятное соотношение калия и натрия, что способствует работе сердечно-сосудистой системы человека.

Основными производителями спаржевой фасоли в мире являются Китай, Франция, Польша, США и Аргентина. Данные FAO по урожайности спаржевой фасоли в странах мира приведены в табл. 1.

Таблица 1

Динамика урожайности фасоли спаржевой в странах мира (2000-2007 гг.)

Страна	Урожайность, ц/га								
	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	среднее
Китай	129,5	129,0	131,5	126,0	129,0	109,7	125,0	133,3	126,6
Франция	105,5	110,0	112,8	105,3	115,2	117,4	117,8	116,4	112,6
Польша	88,6	85,3	98,0	87,9	86,3	89,2	71,5	88,6	86,9
Аргентина	88,0	88,0	80,9	80,4	83,8	83,8	82,7	-	83,9
США	81,2	77,2	81,5	80,3	85,8	81,2	82,5	84,0	81,7
Европа	102,5	105,7	110,9	102,6	110,6	112,0	108,8	111,1	108,0
В мире	81,3	80,5	84,3	83,6	88,4	86,2	87,4	87,4	84,9

По урожайности фасоли овощной в мире (2000-2007 гг.) на первом месте находится Китай – 126,6 ц/га, на втором – Франция (112,6 ц/га), третьем – Польша (86,9 ц/га), затем Аргентина – 83,9 и США – 81,7 ц/га. Средняя урожайность фасоли спаржевой за эти годы в Европе составила 108,0 ц/га, в мире – 84,9 ц/га.

Посевные площади спаржевой фасоли (по данным FAO) за последние 8 лет (с 2000 по 2007 гг.) находились в пределах от 221,5 тыс. га до 306,8 тыс. га. Ведущие производители спаржевой фасоли (2007 г.): США – 125,0 тыс. га (41,1%); Франция – 30,5 (10%); Польша – 7,2; Аргентина – 5,5 тыс. га; Китай – 1,7 тыс. га.

В 2000 г. валовой сбор фасоли спаржевой в США составил 1023,5 тыс. т, или 56,9% от мирового производства (1800,0 тыс. т), в Европе – 398,9 тыс. т (22,2%), в том числе во Франции – 336,9 тыс. т, или 84,5% от всей Европы. В 2007г. валовой сбор фасоли в мире несколько увеличился (2666,1 тыс. т), в т. ч. в США – 1050,0 тыс. т (58,3%), в Европе – 418,8 (23,3%), во Франции – 355,0 тыс. т.

Спаржевая фасоль в Республике Беларусь возделывается, в основном, в частном секторе и в год на одного жителя республики ее производится только около 2 кг, что крайне недостаточно.

Фасоль (*Phaseolus vulgaris* L.) – однолетнее травянистое растение семейства бобовых. Высота куста от 25 до 40 см, плод – боб, прямой или изогнутой формы, плоский или цилиндрический. Фасоль формирует стержневой корень, он может проникать в почву на глубину до 1,0 метра и более. Образующиеся боковые корни разного порядка сосредоточены преимущественно в пахотном слое почвы.

Фасоль спаржевая – культура теплолюбивая, семена прорастают при температуре почвы 8-12 °С, однако, начало энергичного прорастания семян фасоли возможно при температуре почвы на глубине заделки семян от 16 до 18 °С, семена всходят через 7-10 дней. Для роста и развития растений фасоли температура должна быть не ниже 15 °С, оптимальной считается температура 20-25 °С.

Растения сильно страдают от заморозков, однако пострадавшие растения могут восстанавливаться. Норма высева фасоли от 0,3 до 0,5 млн. всхожих семян на один гектар. Глубина заделки семян 3-5 см. Сеять фасоль спаржевую необходимо только районированными сортами, включенными в государственный реестр сортов.

По отношению к влаге фасоль относится к среднетребовательным культурам. Оптимальная влажность почвы для нормального роста и развития фасоли лежит в диапазоне 70-75% наименьшей полевой влагоемкости. В засушливые годы урожайность ее резко снижается [2, 3, 4].

Спаржевая фасоль более требовательна к почвам и их плодородию, чем другие бобовые культуры. Для возделывания фасоли наиболее пригодными являются дерново-подзолистые легкосуглинистые, связно- и рыхлосупесчаные почвы, богатые гумусом, с близкой к нейтральной реакцией почвенного раствора. Высокие урожаи фасоль дает лишь в том случае, если предшественники оставляют поля чистыми от сорняков. Лучшими предшественниками для фасоли в севооборотах являются пропашные, затем озимые и яровые зерновые культуры, многолетние травы, лен, рапс. Нельзя ее размещать после других бобовых культур, так как увеличивается вероятность поражения вирусными и грибковыми заболеваниями. Возврат фасоли на прежнее поле может быть через 4-5 лет, а на полях с высоким инфекционным фоном – через 6-7 лет [5, 6].

Спаржевая фасоль достаточно требовательна к условиям минерального питания. Она отзывчива на внесение минеральных и последствие органических удобрений.

Органические удобрения (навоз, компосты), как правило, применяются под предшествующие культуры в севооборотах. Однако, зеленое удобрение (промежуточные, пожнивные и поукосные культуры, измельченную солому) вносить под фасоль целесообразно и эффективно, особенно при размещении по зерновым предшественникам.

Фасоль не нуждается в больших дозах азота. Обычно эти дозы невысокие (N_{15-45}) и называются «стартовыми», так как применяются для обеспечения растений азотом на начальном этапе роста, когда складываются экстремальные погодные условия (процессы образования нитратного азота в холодной почве идут крайне медленно). Доля фиксированного фасолю азота из воздуха, в общем количестве поглощения этого элемента, составляет около 40%. В минеральном питании исключительно велика роль фосфора, калия, кальция, серы, магния, железа, а из микроэлементов – молибдена, бора, марганца и кобальта, от которых зависит нормальное течение процессов фотосинтеза и азотфиксации. Максимальное потребление элементов питания приходится на период полного налива семян, т.е. интенсивного накопления сухого вещества (бутонизация – созревание). Потребность в фосфоре и калии в 1,5-2,0 раза больше, чем у зерновых культур. Дозы фосфорных и калийных удобрений зависят от содержания этих элементов в почве, величины планируемого урожая, и могут находиться в пределах – $P_{40-100} K_{120-180}$. Фосфор и калий вносят с осени под основную обработку почвы. Критический период потребности азота у фасоли приходится на цветение, а фосфора – на первые 40-45 дней после появления всходов. Следует учитывать, что она очень чувствительна к хлору, поэтому внесение бесхлорных удобрений перспективно и целесообразно [6].

Фасоль хорошо отзывается на предпосевную обработку семян микроудобрениями, а также на внесение магниевых удобрений в дозах 20-25 кг/га и микроэлементов: бора, молибдена, меди, цинка, марганца [7, 8].

Получение высоких и устойчивых урожаев спаржевой фасоли с хорошим качеством продукции должно основываться на применении комплексных удобрений со сбалансированным соотношением элементов питания с добавками микроэлементов и биологически активных веществ, на фоне защиты посевов от сорняков, вредителей и болезней.

Цель наших исследований (2006-2008 гг.) – разработка составов комплексных (твердых и жидких) удобрений для возделывания спаржевой фасоли, установление доз их внесения и сравнительная оценка их действия на урожайность и качество продукции по сравнению со смесями стандартных туков.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объект исследования: спаржевая фасоль, сорт Зинуля.

Предмет исследования – формы и дозы твердых и жидких комплексных азотно-фосфорно-калийных удобрений (хлорсодержащих и бесхлорных) с добавками микроэлементов, почва – дерново-подзолистая легкосуглинистая.

Изучение эффективности разных форм комплексных удобрений при возделывании спаржевой фасоли проводилось:

– на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, развивающейся на мощных лессовидных суглинках в экспериментальной базе РУП «Институт овощеводства» п. Самохваловичи, Минского района Минской области (2006-2008 гг.) со следующими агрохимическими показателями пахотного горизонта: рН в КС1 от 5,69 до 6,25, содержание подвижного P_2O_5 – 299-346 и K_2O (по Кирсанову) от

326-479 мг/кг почвы, обменного CaO – 1909-2246 и MgO – 145-190 мг/кг, содержание гумуса от 2,82 до 3,59%.

– на дерново-подзолистой суглинистой почве, развивающейся на легких моренных суглинках (производственный опыт) в КСУП «Брилево», Гомельского района Гомельской области: рН в KCl – 5,29-5,69, содержание подвижного P₂O₅ – 428-461 и K₂O – 374-399 мг/кг почвы, обменного CaO – 1205-1397 и MgO – 167-174 мг/кг, содержание гумуса – 3,17%.

Закладку и проведение полевых опытов, статистическую обработку результатов исследований проводили в соответствии с методическими указаниями по закладке полевых опытов с использованием программ дисперсионного и корреляционного анализа [9].

Анализ почвенных и растительных образцов проводили в соответствии с общепринятыми методиками: фосфор и калий в почве по методу Кирсанова, обменные кальций и магний методом ЦИНАО-ГОСТ 26487-85, гумус по Тюрину; в растительных образцах после мокрого озоления проб в смеси серной кислоты и пергидроля определяли: азот и фосфор фотокolorиметрическим индофенольным и ванадо-молибдатным методами, калий – на пламенном фотометре, кальций и магний – на атомно-абсорбционном спектрофотометре.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Вода и тепло являются важными факторами, определяющих рост и развитие растений в течение вегетационного периода. Избыток или недостаток влаги и тепла негативно сказывается на урожайности. Среднегодовалые данные осадков и тепла характеризуют эти режимы как оптимальные для роста и развития сельскохозяйственных растений. Гидротермический коэффициент (ГТК) показывает, в каких условиях обеспеченности влагой и теплом идет рост и развитие растений.

В течение вегетационных периодов (апрель-август) возделывания спаржевой фасоли (2006-2008 гг.) распределение осадков, температуры воздуха и суммы температур выше 5 °С было неравномерным (табл. 2).

За апрель-август 2006 г. выпало 454,8 мм осадков, что в 1,25 раза больше среднегодовых (363 мм). При этом недостаточное их количество было в апреле 26 мм и большое в августе – 172,0 мм. Гидротермический коэффициент изменялся с 4,82 (апрель) до 1,29 (июль), а в среднем за вегетационный период составил 2,22, при среднегодовом – 1,75.

Таблица 2

Температура воздуха, количество осадков и гидротермический коэффициент за период апрель-август

Год	Показатели	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	За апрель-август
2006 г.	Осадки, мм	26,0	85,3	91,5	80,0	172,0	454,8
	Сумма t ⁰ > 5 ⁰	53,9	308,0	504,8	618,6	565,1	2050,4
	ГТК	4,82	2,77	1,81	1,29	3,05	2,22
2007 г.	Осадки, мм	6,6	81,1	44,1	124,0	10,4	266,2
	Сумма t ⁰ > 5 ⁰	164	452	559	546	618	2339,0
	ГТК	0,40	1,79	0,79	2,27	0,17	1,14
2008 г.	Осадки, мм	106,4	157,1	45,3	169,3	117,9	596,0
	Сумма t ⁰ > 5 ⁰	277,7	369,8	496,5	563,6	570,4	2278,0
	ГТК	3,83	4,25	0,91	3,00	2,07	2,62
Средне-многолетнее	Осадки, мм	48	61	81	90	83	363,0
	t ⁰ С	5,3	12,4	16,1	17,6	16,3	13,5
	Сумма t ⁰ > 5 ⁰	159,0	384,4	483,0	545,6	505,3	2077,3
	ГТК	3,02	1,59	1,68	1,65	1,64	1,75

В апреле-августе 2007 г. выпало 266,2 мм осадков, что в 1,36 раза меньше среднегодовых (363 мм). Гидротермический коэффициент по Селянинову в течение вегетационного периода изменялся в пределах от 0,17 до 2,27. Очень низкий он был в апреле (0,40), июне (0,79) и в августе (0,17). ГТК в среднем за вегетационный период составил 1,14.

За апрель-август 2008 г. выпало 596,0 мм осадков, что в 1,64 раза больше среднемноголетних (363 мм). Гидротермический коэффициент в течение вегетационного периода изменялся в пределах от 0,91 (июнь) до 4,25 (май). В июле ГТК – 3,00, а в среднем за вегетационный период он составил 2,62.

В КСУП «Брилево» Гомельского района (исследования проводились только в 2006 г.) осадки были следующие: апрель – 32 мм, май – 85, июнь – 136, июль – 45 и август – 172 мм. Гидротермический коэффициент в среднем за вегетационный период составил 2,29.

Приведенные данные показывают, что эффективность удобрений испытывалась в различные по степени увлажнения годы: гидротермический коэффициент за вегетационный период возделывания спаржевой фасоли (апрель-август) в 2006 г. характеризовался как влажный (ГТК = 2,22-2,29), в 2007 г. – слабозасушливый (ГТК = 1,14), 2008 г. – влажный (ГТК = 2,62), при среднемноголетнем – 1,75.

Урожайность спаржевой фасоли на дерново-подзолистой легкосуглинистой, развивающейся на легких лессовидных суглинках почве, изменялась в зависимости от форм и доз применяемых комплексных удобрений. Самая низкая урожайность бобов спаржевой фасоли во все годы исследований получена на контрольных вариантах без применения удобрений – 94,1 ц/га (среднее за годы исследований), с накоплением сухого вещества 6,9 ц/га. В зависимости от применяемых форм и доз комплексных удобрений урожайность бобов находилась в пределах от 117,4 до 139,9 ц/га, соответственно, сухого вещества – от 8,7 до 10,6 ц/га. При применении комплексного бесхлорного удобрения марки NPK – 5:16:29 с микроэлементами наиболее эффективной дозой оказалась N₂₅P₈₀K₁₄₅ (250 кг/га д.в.), обеспечивающая урожайность на уровне 139,9 ц/га. Применение NPK – 6:14:24 с микроэлементами обеспечило максимальную урожайность (138,9 ц/га) при дозе внесения N₂₅P₅₈K₁₀₀ (183 кг/га д.в.). Повышенные дозы комплексных удобрений (N₃₅P₁₁₂K₂₀₃ и N₃₅P₈₂K₁₄₀) не обеспечивали дальнейшего увеличения урожайности фасоли. Следует также отметить, что более высокая урожайность фасоли получена в слабозасушливом 2007 году. Применение разных форм комплексных бесхлорных удобрений (N₂₅P₈₀K₁₄₅ и N₂₅P₅₈K₁₀₀) обеспечивало увеличение урожайности фасоли спаржевой на 14,8 ц/га (11,8%) от марки NPK – 5:16:29 и 13,8 ц/га (11,0%) от NPK – 6:14:24, по сравнению с хлорсодержащими удобрениями (базовым вариантом, (табл. 3).

ТАБЛИЦА 3

УРОЖАЙНОСТЬ ФАСОЛИ СПАРЖЕВОЙ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ
(П. САМОХВАЛОВИЧИ, МИНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ), 2006-2008 ГГ.

Вариант	Урожайность при уборке, ц/га				Урожайность, сухое вещество, ц/га			
	2006 г.	2007 г.	2008 г.	среднее	2006 г.	2007 г.	2008 г.	среднее
Контроль без удобрений	59,2	114,4	108,8	94,1	5,0	7,7	8,1	6,9
N ₂₅ P ₈₀ K ₁₄₅ (смесь стандартных удобрений+ некорневая подкормка В и Мо)* – базовый вариант	89,1	166,7	119,6	125,1	7,3	11,6	8,6	9,2
N ₂₅ P ₈₀ K ₁₄₅ (смесь стандартных удобрений)** – базовый вариант	90,2	-	-	-	7,1	-	-	-
N ₁₅ P ₄₈ K ₈₇ (бесхлорные), NPK – 5:16:29 с Mg, S, В, Мо	98,1	167,9	114,1	126,7	7,9	10,8	9,8	9,5
N ₂₅ P ₈₀ K ₁₄₅ (бесхлорные), NPK – 5:16:29 с Mg, S, В, Мо	112,3	174,2	133,3	139,9	8,6	11,9	9,5	10,0
N ₃₅ P ₁₁₂ K ₂₀₃ (бесхлорные), NPK – 5:16:29 с Mg, S, В, Мо	103,6	174,8	129,9	136,1	7,9	12,6	10,2	10,2
N ₁₅ P ₃₅ K ₆₀ (бесхлорные), NPK – 6:14:24 с Mg, S, В, Мо, Zn, Fe	84,7	151,8	115,8	117,4	7,0	10,4	8,6	8,7
N ₂₅ P ₅₈ K ₁₀₀ (бесхлорные),	117,4	166,8	132,6	138,9	9,9	12	10,0	10,6

NPK – 6:14:24 с Mg, S, B, Mo, Zn, Fe								
N ₃₅ P ₈₂ K ₁₄₀ (бесхлорные), NPK – 6:14:24 с Mg, S, B, Mo, Zn, Fe	94,9	180,0	130	135,0	7,7	13	9,5	10,1
HCP ₀₅	16,6	4,96	6,9	10,7	1,26	0,36	0,57	0,42

*смесь стандартных удобрений (аммонизированный суперфосфат + хлористый калий, либо комплексное хлорсодержащее удобрение) + некорневая подкормка микроэлементами (молибденом) – базовый вариант.

**смесь стандартных удобрений (аммонизированный суперфосфат, сульфат калия).

Аналогичные закономерности по действию комплексных удобрений получены в производственном опыте на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, развивающейся на моренных суглинках (КСУП «Брилево», Гомельского района Гомельской области) (табл. 4).

Таблица 4

Урожайность спаржевой фасоли в производственном опыте на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в КСУП «Брилево» Гомельского района, 2006 г.

Вариант	Урожайность, ц/га			
	при уборке	прибавка к базовому	сухое вещество	прибавка к базовому
Контроль без удобрений	62,5	-	5,5	-
N ₂₅ P ₈₀ K ₁₄₅ (смесь стандартных удобрений + некорневая подкормка B и Mo) * – базовый вариант	74,1	-	6,4	-
N ₁₅ P ₄₈ K ₈₇ (бесхлорные) NPK – 5:16:29 с Mg, S, B, Mo	77,1	3,0	8,7	2,3
N ₂₅ P ₈₀ K ₁₄₅ (бесхлорные) NPK – 5:16:29 с Mg, S, B, Mo	82,5	8,4	9,2	2,8
N ₃₅ P ₁₁₂ K ₂₀₃ (бесхлорные) NPK – 5:16:29 с Mg, S, B, Mo	79,2	5,1	7,2	0,8
N ₂₅ P ₅₈ K ₁₀₀ (хлорсодержащее комплексное) – базовый вариант	74,5	-	6,5	-
N ₂₅ P ₅₈ K ₁₀₀ (смесь стандартных удобрений)**	74,5	-	6,7	-
N ₁₅ P ₃₅ K ₆₀ (бесхлорные), NPK – 6:14:24 с Mg, S, B, Mo, Zn, Fe	83,2	8,7	7,9	1,2
N ₂₅ P ₅₈ K ₁₀₀ (бесхлорные), NPK – 6:14:24 с Mg, S, B, Mo, Zn, Fe	87,2	12,7	8,6	1,9
N ₃₅ P ₈₂ K ₁₄₀ (бесхлорные), NPK – 6:14:24 с Mg, S, B, Mo, Zn, Fe	85,9	11,4	8,3	1,6
HCP ₀₅	7,6	-	0,46	-

*смесь стандартных удобрений (аммонизированный суперфосфат + хлористый калий, либо комплексное хлорсодержащее удобрение);

**смесь стандартных удобрений (аммонизированный суперфосфат, сульфат калия).

В последнее время в зарубежной и отечественной практике под многие сельскохозяйственные культуры применяется широкий спектр некорневых жидких удобрений, или концентратов, содержащих важнейшие элементы питания растений и микроэлементы.

В Республике Беларусь РУП «Институт почвоведения и агрохимии» совместно с ОАО «Гомельский химический завод» разработаны жидкие комплексные удобрения (ЖКУ) с хелатными формами микроэлементов для бобовых культур (марка NPK – 5:7:10 с B, Mo (в хелатной форме), предназначенные для обработки растений в период вегетации.

Эффективность жидких комплексных удобрений при некорневых обработках растений фасоли спаржевой изучалась в течение 2007-2008 гг. на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве на фоне основного внесения в почву комплексного удобрения NPK с Mg, S, B, Mo, Zn, Fe в дозе N₂₅P₅₈K₁₀₀. Установлено, что применение в фазу бутонизации фасоли спаржевой комплексного жидкого удобрения с хелатными формами микроэлементов в дозе 5 л/га на фоне основного внесения в почву комплексных удобрений обеспечивало увеличение урожайности бобов фасоли на 14,8 (2007 г.) – 5,2 (2008 г.) ц/га (в среднем на 10 ц/га), по сравнению с вариантом, где некорневая подкормка ЖКУ не проводилась (табл. 5).

ТАБЛИЦА 5

УРОЖАЙНОСТЬ ФАСОЛИ СПАРЖЕВОЙ ПРИ ВНЕСЕНИИ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ, (П. САМОХВАЛОВИЧИ, МИНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Вариант	Урожайность, ц/га			Урожайность на сухое вещество, ц/га		
	2007 г.	2008 г.	среднее	2007 г.	2008 г.	среднее
N ₂₅ P ₅₈ K ₁₀₀ NPK комплексные с Mg, S, B, Mo, Zn, Fe – фон	166,8	132,6	149,7	12,0	10,0	11,0
N ₂₅ P ₅₈ K ₁₀₀ комплексные с Mg, S, B, Mo, Zn, Fe + некорневая подкормка ЖКУ (бобовое) в дозе 5 л/га в фазу бутонизации	181,7	137,8	159,8	13,2	10,3	11,8
НСР ₀₅	4,9	3,1	4,1	0,36	0,29	0,33

На рис. 1 приведена гистограмма влияния разных форм и доз комплексных удобрений на урожайность фасоли спаржевой (среднее за годы исследований). Приведенные данные свидетельствуют, что дозы вносимых удобрений более существенно влияют на урожайность фасоли спаржевой по сравнению с формами комплексных удобрений.

Рис. 1. Влияние комплексных твердых и жидких удобрений на урожайность спаржевой фасоли (среднее за 2006-2008 гг.), ц/га

Качество бобов фасоли спаржевой оценивалось по содержанию нитратов, товарности и химическому составу (табл.6-7).

ТАБЛИЦА 6

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ФАСОЛИ СПАРЖЕВОЙ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ, (П. САМОХВАЛОВИЧИ, МИНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ), 2007-2008 ГГ.

Вариант	Содержание нитратов, мг/кг			Процент товарности бобов фасоли, %		
	2007 г.	2008 г.	среднее	«Брилево»	п. Самохваловичи	среднее

Контроль без удобрений	707	149	428	92,8	92,3	92,6
N ₂₅ P ₈₀ K ₁₄₅ (смесь стандартных удобрений + некорневая подкормка В и Мо) базовый вариант	763	170	467	96,0	88,5	92,3
N ₁₅ P ₄₈ K ₈₇ (бесхлорные) NPK – 5:16:29 с Mg, S, B, Mo	740	100	420	95,9	86,7	91,3
N ₂₅ P ₈₀ K ₁₄₅ (бесхлорные) NPK – 5:16:29 с Mg, S, B, Mo	733	93	413	96,1	92,9	94,5
N ₃₅ P ₁₁₂ K ₂₀₃ (бесхлорные) NPK – 5:16:29 с Mg, S, B, Mo	747	113	430	95,6	96,8	96,2
N ₁₅ P ₃₅ K ₆₀ (бесхлорные) NPK – 6:14:24 с Mg, S, B, Mo, Zn, Fe	737	101	419	95,8	91,7	93,8
N ₂₅ P ₅₈ K ₁₀₀ (бесхлорные) NPK – 6:14:24 с Mg, S, B, Mo, Zn, Fe	566	103	335	95,1	94,0	94,6
N ₃₅ P ₈₂ K ₁₄₀ (бесхлорные) NPK – 6:14:24 с Mg, S, B, Mo, Zn, Fe	580	118	349	96,3	95,8	96,1
N ₂₅ P ₅₈ K ₁₀₀ с Mg, S, B, Mo, Zn, Fe + некорневая подкормка ЖКУ (для бобовых культур) в дозе 5 л/га в фазу бутонизации	568	115	342	-	96,7	-
HCP ₀₅	26,7	9,7	20,1	-	-	-

Содержание нитратов в бобах фасоли существенно различалось по годам, например, в 2007 (слабозасушливом) году оно находилось в пределах от 566 до 763 мг/кг, 2008 г. (влажном) – от 93 до 170 мг/кг, в зависимости от вариантов опыта (содержание нитратов в бобах спаржевой фасоли не нормируется). При этом в оба года исследований содержание нитратов в фасоли спаржевой в вариантах с новыми формами удобрений было значительно ниже, чем в варианте с использованием стандартных форм удобрений. Товарность бобов спаржевой фасоли в опытах на дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах была высокой и находилось в пределах: в 2007 г. от 92,8% до 96,3%, в 2008 г. – от 86,7% до 96,8%, (табл. 6).

Содержание элементов питания в бобах фасоли спаржевой незначительно изменялось по годам исследований. Содержание азота, в среднем за годы исследований, в зависимости от вариантов опыта находилось в пределах – от 1,98 до 2,82, P₂O₅ – 1,59-1,78, K₂O – 3,9-5,03, кальция – 0,29-0,41 и магния – 0,29-0,36% на сухое вещество (табл. 7).

ТАБЛИЦА 7

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ БОБОВ ФАСОЛИ СПАРЖЕВОЙ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ, (П. САМОХВАЛОВИЧИ, МИНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ), 2006-2008 Г.

Вариант	Содержание, %				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Ca	Mg
Контроль без удобрений	2,67	1,67	3,90	0,34	0,36
N ₂₅ P ₈₀ K ₁₄₅ (смесь стандартных удобрений + некорневая подкормка В и Мо) – базовый вариант	2,42	1,66	4,16	0,37	0,30
N ₁₅ P ₄₈ K ₈₇ (бесхлорные) NPK – 5:16:29 с Mg, S, B, Mo	2,62	1,74	4,22	0,38	0,29
N ₂₅ P ₈₀ K ₁₄₅ (бесхлорные) NPK – 5:16:29 с Mg, S, B, Mo	2,82	1,78	5,03	0,40	0,34
N ₃₅ P ₁₁₂ K ₂₀₃ (бесхлорные) NPK – 5:16:29 с Mg, S, B, Mo	2,10	1,78	4,65	0,41	0,33
N ₁₅ P ₃₅ K ₆₀ (бесхлорные) NPK – 6:14:24 с Mg, S, B, Mo, Zn, Fe	2,68	1,74	4,85	0,36	0,32
N ₂₅ P ₅₈ K ₁₀₀ (бесхлорные) NPK – 6:14:24 с Mg, S, B, Mo, Zn, Fe	2,32	1,63	4,60	0,35	0,31
N ₃₅ P ₈₂ K ₁₄₀ (бесхлорные) NPK – 6:14:24 с Mg, S, B, Mo, Zn, Fe	1,98	1,59	4,17	0,29	0,29
N ₂₅ P ₅₈ K ₁₀₀ с Mg, S, B, Mo, Zn, Fe + некорневая подкормка ЖКУ (бобовое) в дозе 5 л/га в фазу бутонизации	2,60	1,63	4,23	0,32	0,34

НСП ₀₅	0,11	0,04	0,07	0,003	0,01
-------------------	------	------	------	-------	------

Вынос элементов питания с 1 т бобов фасоли спаржевой, которые в наших опытах занимают около 50-55% от общего веса растения, в зависимости от форм и доз комплексных удобрений, находился в пределах: азота (N) от 23,2 до 28,2 кг (в среднем – 25,4 кг), соответственно – фосфора (P₂O₅) от 16,3 до 17,8 кг (16,8 кг), калия (K₂O) от 41,6 до 50,3 кг (45,1 кг), кальция (Ca) – от 3,2 до 4,0 кг (3,6 кг), магния (Mg) от 3,0 до 3,4 кг (3,2 кг), (табл. 8).

Таблица 8

Вынос элементов питания бобами спаржевой фасоли (экспериментальная база РУП «Институт овощеводства» п. Самохваловичи, Минского района Минской области)

Вариант	Вынос, кг/т продукции				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Ca	Mg
N ₂₅ P ₈₀ K ₁₄₅ (смесь стандартных удобрений + некорневая подкормка В и Мо) – базовый вариант	24,2	16,6	41,6	3,7	3,0
N ₂₅ P ₈₀ K ₁₄₅ (бесхлорные) NPK – 5:16:29 с Mg, S, B, Mo	28,2	17,8	50,3	4,0	3,4
N ₂₅ P ₅₈ K ₁₀₀ (бесхлорные) NPK – 6:14:24 с Mg, S, B, Mo, Zn, Fe	23,2	16,3	46,0	3,6	3,1
N ₂₅ P ₅₈ K ₁₀₀ с Mg, S, B, Mo, Zn, Fe + некорневая подкормка ЖКУ (бобовое) в дозе 5 л/га в фазу бутонизации	26,0	16,3	42,3	3,2	3,4
Среднее	25,4	16,8	45,1	3,6	3,2

Лучшими дозами комплексных удобрений с микроэлементами, при которых обеспечивается максимальный вынос элементов питания бобами спаржевой фасоли, оказались N₂₅P₈₀K₁₄₅ (марка NPK = 5:16:29) и N₂₅P₅₈K₁₀₀ (марка NPK = 6:14:24).

Дозы комплексных удобрений под фасоль спаржевую на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах рассчитываются по азоту в комплексном удобрении, в зависимости от планируемого урожая и содержания подвижных форм фосфора и калия в почвах табл. 9.

Таблица 9

Дозы комплексных удобрений под фасоль спаржевую, кг ф.в. /га

Комплексные удобрения	Содержание P ₂ O ₅ и K ₂ O, мг/кг почвы	Планируемый урожай (бобы), ц/га			
		60-70	70-80	80-100	100-120
		Дозы удобрений, кг/га			
		15** (N кг/га д.в.)	20**	25**	30-35**
N ₅ P ₁₆ K ₂₈₋₂₉ бесхлорное с модифицирующим и добавками	P ₂ O ₅ до 150 K ₂ O до 200	300*	400*	500*	600-700*
N ₆ P ₁₄ K ₂₄ бесхлорное с модифицирующим и добавками	P ₂ O ₅ от 150 и более K ₂ O от 200 и более	250	333	417	500-580
N ₇ P ₁₆ K ₂₄ (хлор-содержащее) с модифицирующими добавками	P ₂ O ₅ от 150 и более K ₂ O от 200 и более	214	286	357	430-500

*Вес удобрения, кг/га;

**Доза действующего вещества азота в комплексном удобрении, по которой рассчитывается физический вес удобрения на 1га.

ВЫВОДЫ

1. Для возделывания спаржевой фасоли разработаны комплексные удобрения с добавками микроэлементов для почв различного уровня плодородия: марки NPK – 5:16:29 с Mg, S, B, Mo и NPK – 6:14:24 с Mg, S, B, Mo, Zn, Fe.

2. Для получения урожайности бобов спаржевой фасоли на дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах на уровне 100-140 ц/га и товарности 90-95% рекомендуется внесение комплексных удобрений с добавками микроэлементов в основное внесение в почву в дозе $N_{25}P_{58-80}K_{100-145}$, обеспечивающих увеличение урожайности на 8,4-14,8 ц/га, по сравнению со смесями стандартных туков.

3. Некорневые подкормки спаржевой фасоли в период вегетации жидкими комплексными удобрениями с хелатными формами микроэлементов (марка NPK – 5:7:10 с B и Mo) обеспечивают повышение урожайности бобов в пределах 10-15%. Подкормки проводятся 1-2 раза за вегетацию: 1-я – фаза бутонизации (3-5 л/га); 2-я – после цветения (3-6 л/га), при рабочем растворе 200-300 л/га.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аутко, А.А. В мире овощей / А.А. Аутко. – Мн.: УП «Технопринт», 2004. – 448 с.
2. Шкляр, А.П. Спаржевая фасоль / А.П. Шкляр // Белорусское сельское хозяйство. – 2006. – № 3. – С. 36-37.
3. Аутко, А.А. Технологии возделывания овощных культур / А.А. Аутко. – Мн.: Изд ООО «Красико-Принт», 2001. – С. 122-123.
4. Радыно, Л.В. Спаржевая фасоль / Л.В. Радыно // Хозяин. – 1985. – № 12. – С. 12.
5. Иванов, Н. Р. Фасоль / Н. Р. Иванов. – М.: Ленинград. – 1961. – 280 с.
6. Технология производства продукции растениеводства / Под ред. В.Ф. Мальцева, М.К. Каюллова // Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 601 с.
7. Агротехника / И.Р. Вильдфлуш [и др.]. – Минск: Ураджай, 1995. – С.308-310.
8. Виноградова, х.г. молибден и его биологическая роль / х.г. виноградова // микроэлементы в жизни растений и животных: тр. конференции по микроэлементам 15-19 марта 1950 г., изд. ан ссср, 1952. – с. 515-538.
9. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – Москва: Колос, 1973. – 335 с.

EFFICIENCY OF COMPLEX NITROGEN-PHOSPHORUS-POTASSIUM FERTILIZERS WITH MICROELEMENTS IN TECHNOLOGY OF ASPARAGUS BEAN CULTIVATION

H.V. PIRANOUSKAYA, A.M. RUSALOVICH, O.P. SAZONENKO, V.I. SOROKO, O.I. ISAJEVA, A.A. AUTKO

Data on new forms complex nitrogen-phosphorus-potassium fertilizers with additives of microelements for asparagus bean are resulted in the article. Their efficiency on soils with a different fertility level and influence on quality production is considered.

Поступила 1 апреля 2009 г.